

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Viburcol végbélkúp

Hatóanyagok: Calcium carbonicum Hahnemanni D8, Pulsatilla pratensis D2, Chamomilla recutita D1, Atropa belladonna D2, Solanum dulcamara D4, Plantago major D3

Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa, vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát, vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont.
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 7 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Viburcol végbélkúp (a továbbiakban: Viburcol) és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Viburcol alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Viburcolt?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Viburcolt tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A VIBURCOL ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

A Viburcol homeopátiás gyógyszer.

A homeopátiás hagyománynak megfelelően alkalmazható:

- lázas vagy láz nélküli nyugtalansági állapotokban,
- enyhe fertőzésekben a tünetek csökkentésére.

2. TUDNIVALÓK A VIBURCOL ALKALMAZÁSA ELŐTT

Ne alkalmazza a Viburcolt ha allergiás

- a hatóanyagokra, vagy a gyógyszer (6.pontban felsorolt) egyéb összetevőjére,
- a fészkesvirágzatúak családjába tartozó növényekre, mint. pl. a kamilla.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

A homeopátiás gyógyszerek alkalmazásának kezdetén a meglévő panaszok átmenetileg erősödhetnek. Ilyen esetben a Viburcol alkalmazását időlegesen fel kell függeszteni és orvoshoz kell fordulni.

A homeopátiás gyógyszert nem szabad az indokoltnál hosszabb ideig, vagy a tünetek megszűnését követően alkalmazni, mert ilyen esetben nem kívánatos hatások (ún. gyógyszervizsgálati tünetek) léphetnek fel.

A homeopátiás gyógyszer alkalmazásának időtartama alatt nem szabad illóolajat is tartalmazó (mentolos, eukaliptuszos) termékeket (cukorka stb.) fogyasztani és intenzív illatú fogkrémet használni. A kezelés ideje alatt aromás anyagokat tartalmazó kenőcsöt (pl. kámforos) sem szabad alkalmazni, mivel ezek jelentős mértékben képesek befolyásolni a homeopátiás gyógyszer hatását.

Egyéb gyógyszerek és a Viburcol

Nem ismert, hogy a Viburcol befolyásolja más gyógyszerkészítmények hatását, vagy más gyógyszerkészítmények befolyásolják a Viburcol hatását.

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett, valamint szedni tervezett egyéb gyógyszereiről.

Terhesség, szoptatás és termékenység

A Viburcol alkalmazása nem javasolt terhesség és szoptatás ideje alatt.

A készítmény hatóanyagainak a termékenységet befolyásoló hatására vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A Viburcolnak a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket befolyásoló hatásait nem vizsgálták.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A VIBURCOLT?

A Viburcolt mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

A készítmény ajánlott adagja:

Felnőtteknek és 6 év feletti gyermekeknek: naponta 4-szer 1 végbélkúp. Akut esetben 2 óránként 1 végbélkúp, legfeljebb napi 8 alkalommal.

2-5 éves gyermekeknek: naponta 3-szor 1 végbélkúp. Akut esetben 2 óránként 1 végbélkúp, legfeljebb napi 6 alkalommal.

0-1 éves gyermekeknek: naponta 2-szer 1 végbélkúp. Akut esetben 2 óránként 1 végbélkúp, legfeljebb napi 4 alkalommal.

Az alkalmazás módja

A kúpot a végbélbe kell helyezni.

A panaszok enyhülésekor az adagolás gyakoriságát csökkenteni kell.

Az alkalmazás időtartama

Az Ön panaszai határozzák meg a kezelés időtartamát, kérdezze erről orvosát, gyógyszerészét.

Amennyiben tünetei 7 napon belül nem enyhülnek vagy súlyosbodnak, vagy új tünetek jelennek meg, keresse fel kezelőorvosát.

Ha az előírtnál több Viburcolt alkalmazott

Keresse fel orvosát vagy gyógyszerészét, a gyógyszer csomagolását valamint a megmaradt végbélkúpokat vigye magával.

Ha elfelejtette alkalmazni a Viburcolt

Ne alkalmazzon kétszeres adagot a kihagyott adag pótlására. A következő adagot alkalmazza a szokásos időben.

Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így a Viburcol is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Mellékhatások előfordulhatnak a következő gyakorisággal:

Nagyon ritkán (10 000-ből kevesebb, mint 1 gyógyszerfelhasználó esetén):

- allergiás bőrreakciók.

Ilyen esetben a készítmény alkalmazását abba kell hagyni és orvoshoz kell fordulni.

Mellékhatások bejelentése

Ha Önél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát, vagy gyógyszerészét. Ez a beteg tájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti postai úton a GYEMSZI Országos Gyógyszerészeti Intézet, Postafiók 450, H-1372 Budapest címre, vagy elektronikusan a www.ogyi.hu weboldalon keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

5. HOGYAN KELL A VIBURCOLT TÁROLNI?

- A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
- Legfeljebb 25°C-on, a nedvességtől és a fénytől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolható.
- A dobozon, valamint a fóliacsíkon feltüntetett lejárati idő (Felhasználható:/Felh. :) után ne alkalmazza a Viburcolt. A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.
- Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. A CSOMAGOLÁS TARTALMA ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz a Viburcol

1 végbélkúp (1,1 g) hatóanyag-tartalma:

Calcium carbonicum Hahnemanni	D8	4,4 mg
Pulsatilla pratensis	D2	2,2 mg
Chamomilla recutita	D1	1,1 mg
Atropa belladonna	D2	1,1 mg
Solanum dulcamara	D4	1,1 mg
Plantago major	D3	1,1 mg

Egyéb összetevők: szilárd zsír (adeps solidus).

Milyen a Viburcol külleme és mit tartalmaz a csomagolás

A Viburcol fehér vagy csaknem fehér színű, torpedó alakú, homogén, sima felületű, jellegzetes szagú végbélkúp.

A végbélkúpok PVC fóliacsíokban és dobozban kerülnek forgalomba.

A csomagolás 12 db (2x6 db) végbélkúpot tartalmaz.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. Reckeweg-Str. 2-4,

76532 Baden-Baden,

Németország

Telefon: 00 49 (0) 7221 501 00, Fax: 00 49 (0) 7221 501 210

Email: info@heel.de

Helyi képviselő:

Dr. Peithner Budapest Kft.,

Tel.: +36 1 431 8954,

Fax: +36 1 431 8953

E-mail: peithun@t-online.hu

OGYI-HG-049/01

A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2014. június