

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Zeel tablettá

Hatóanyagok: Cartilago suis D4, Funiculus umbilicalis suis D4, Embryo suis D4, Placenta suis D4, Toxicodendron quercifolium D2, Arnica montana D1, Solanum dulcamara D2, Symphytum officinale D8, Sanguinaria canadensis D3, Sulfur D6, Nadidum (nicotinamid-adenin-dinucleotid) D6, Coenzym A D6, Acidum alpha-liponicum D6, Natrium diethyloxalaceticum D6, Acidum silicicum D6.

Mielőtt elkezd szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa, vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4.pont.
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 7 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegtájékoztató tartalma

1. Milyen típusú gyógyszer a Zeel tablettá és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Zeel tablettá szedése előtt
3. Hogyan kell szedni a Zeel tablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Zeel tablettát tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A ZEEL TABLETTA ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

A Zeel tablettá homeopátiás gyógyszer.

A homeopátiás hagyománynak megfelelően alkalmazható a tünetek csökkentésére:

- az ízületek elfajulással járó megbetegedése (artrózis), elsősorban térdízületi, csigolyaízületi, vagy egyszerre sok ízületet érintő artrózisok esetén.
- a vállízület körüli kötőszövet fájdalmas gyulladása esetén.

2. TUDNIVALÓK A ZEEL TABLETTA SZEDÉSE ELŐTT

Ne szedje a Zeel tablettát, ha

- allergiás a hatóanyagokra (főként mérges szömörccére, árnikára) vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére, vagy a szömörcefélék és fészkesvirágzatúak családjába tartozó növényekre.
- terhes, vagy szoptat.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

A Zeel tablettá szedése előtt beszéljen kezelőorvosával, ha

- korábban vagy jelenleg valamely májbetegségben szenvedett/szenved.
- egyidejűleg valamely májkárosító gyógyszert szed.

Ebben az esetben a Zeel tablettá kizárólag az orvos javaslatára és felügyelete mellett alkalmazható.

Négy hétnél hosszabb ideig történő alkalmazás esetén a máj működését jelző vértékeket orvosával rendszeresen ellenőriztetni szükséges.

Ha akut gyulladás tünetei jelentkeznek, úgymint bőrvörösség, duzzanat, forróságérzet a csontban, orvoshoz kell fordulni.

A homeopátiás gyógyszerek alkalmazásának kezdetén a fennálló tünetek átmenetileg erősödhetnek. Ilyen esetben a Zeel tablettát időlegesen fel kell függeszteni és orvoshoz kell fordulni. A gyógyszert nem szabad a tünetek megszűnését követően alkalmazni. Ilyen esetekben nem kívánatos hatások (ún. gyógyszervizsgálati tünetek) léphetnek fel.

A homeopátiás gyógyszer alkalmazásának időtartama alatt nem szabad illóolajat is tartalmazó (mentolos, eukaliptuszos) termékeket (cukorka stb.) fogyasztani és intenzív illatú fogkrémet használni. A kezelés ideje alatt aromás anyagokat tartalmazó kenőcsöt (pl. kámforos) sem szabad alkalmazni, mivel ezek jelentős mértékben képesek befolyásolni a homeopátiás gyógyszer hatását.

Gyermekek

A Zeel tablettát nem javasolt 12 év alatti gyermekeknek a biztonságosságra és a hatékonyságra vonatkozó adatok hiánya miatt.

Egyéb gyógyszerek és a Zeel tablettát

Nem ismert, hogy a Zeel tablettát befolyásolja más gyógyszerkészítmények hatását, vagy más gyógyszerkészítmények befolyásolják a Zeel tablettát hatását.

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett, valamint szedni tervezett egyéb gyógyszereiről.

Terhesség, szoptatás és termékenység

A Zeel tablettát terhesség és szoptatás időszakában való alkalmazásáról nem állnak rendelkezésre klinikai adatok. Sanguinaria canadensis (vérzömák) tartalma miatt terhesség és szoptatás ideje alatt nem szabad alkalmazni.

A készítmény hatóanyagainak a termékenységet befolyásoló hatására vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A Zeel tablettát a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket befolyásoló hatásait nem vizsgálták.

A Zeel tablettát tejcukrot (laktózt) tartalmaz.

Amennyiben kezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny, keresse fel orvosát vagy gyógyszerészét mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert.

3. HOGYAN KELL SZEDNI A ZEEL TABLETTÁT?

A Zeel tablettát mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

A készítmény ajánlott adagja felnőtteknek és 12 éven felüli serdülőknek: naponta 3-5-ször 1 tablettát.

A panaszok enyhülésekor az adagolás gyakoriságát csökkenteni kell.

Az alkalmazás módja

Étkezés előtt legalább 30 perccel vegye be a tablettát. Mielőtt lenyeli, tartsa a szájában amíg az szétesik.

Az alkalmazás időtartama

A kezelés időtartamát az Ön tünete, panaszai határozzák meg, kérdezze erről orvosát, gyógyszerészét. Amennyiben tünete 7 napon belül nem enyhülnek, súlyosbodnak, vagy új tünetek jelennek meg keresse fel kezelőorvosát.

Ha az előírtnál több Zeel tablettát vett be

Keresse fel kezelőorvosát, aki az esetleges szükséges intézkedésekről dönteni tud.

Ha elfelejtette bevenni a Zeel tablettát

Ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott tablettá pótlására. A következő tablettát vegye be a szokásos időben.

Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így a Zeel tablettá is okozhat mellékhatásokat, melyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Mellékhatások előfordulhatnak a következő gyakorisággal:

Nagyon ritkán (10 000-ból kevesebb, mint 1 gyógyszereszedő esetében) gyomor-, bélpanaszok, bőrtünetek - az alkalmazás után néhány nappal is -, továbbá túlérzékenységi reakciók jelentkezhetnek.

Ilyen esetben a gyógyszer alkalmazását fel kell függeszteni és orvoshoz kell fordulni.

Mellékhatások bejelentése

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát, vagy gyógyszerészét. Ez a beteg tájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti postai úton a GYEMSZI Országos Gyógyszerészeti Intézet, Postafiók 450, H-1372 Budapest címre, vagy elektronikusan a www.ogyi.hu weboldalon keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

5. HOGYAN KELL A ZEEL TABLETTÁT TÁROLNI?

- A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
- Legfeljebb 25°C-on, a nedvességtől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó.
- A dobozon és a műanyag tartályon feltüntetett lejárati idő („Felhasználható:”) után ne szedje a Zeel tablettát. A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.
- Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. A CSOMAGOLÁS TARTALMA ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz a Zeel tablettá

1 tablettá hatóanyag-tartalma:

Cartilago suis	D4	0,30 mg
----------------	----	---------

Funiculus umbilicalis suis	D4	0,30 mg
Embryo suis	D4	0,30 mg
Placenta suis	D4	0,30 mg
Toxicodendron quercifolium	D2	0,54 mg
Arnica montana	D1	0,60 mg
Solanum dulcamara	D2	0,15 mg
Symphytum officinale	D8	0,15 mg
Sanguinaria canadensis	D3	0,45 mg
Sulfur	D6	0,54 mg
Nadidum (nicotinamid-adenin-dinucleotid)	D6	0,03 mg
Coenzym A	D6	0,03 mg
Acidum alpha-liponicum	D6	0,03 mg
Natrium diethyloxalaceticum	D6	0,03 mg
Acidum silicicum	D6	3,00 mg

Egyéb összetevők: laktóz-monohidrát (kb. 300 mg), magnézium-sztearát.

Milyen a Zeel tableta külleme és mit tartalmaz a csomagolás

Sárgás-fehér, kerek, lapos felületű, metszett élű tableta.

A tabletták műanyag kupakkal lezárt műanyag tartályban és dobozban kerülnek forgalomba.

A csomagolás 50 db vagy 250 db tablettát tartalmaz.

Nem feltétlenül mindegyik kiszereelés kerül kereskedelmi forgalomba.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó

Biologische Heilmittel Heel GmbH,

Dr. -Reckeweg-Str. 2-4,

76532 Baden-Baden,

Németország

Telefon: 00 49 (0) 7221 501 00, Fax: 00 49 (0) 7221 501 210

Email: info@heel.de

Helyi képviselő:

Dr. Peithner Budapest Kft.,

Tel.: +36 (1) 431 8954

Fax: +36 (1) 431 8953

e-mail: peithun@t-online.hu

OGYI-HG-059/03 50 tableta

OGYI-HG-059/04 250 tableta

A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2014. május.