

## BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

### Engystol tabletta

Hatóanyagok: Vincetoxicum hirundinaria D6, Vincetoxicum hirundinaria D10, Vincetoxicum hirundinaria D30, Sulfur D4, Sulfur D10

**Mielőtt elkezdni szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.**

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa, gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát, vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont.
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

#### A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer az Engystol tabletta (a továbbiakban: Engystol) és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók az Engystol szedése előtt
3. Hogyan kell szedni az Engystolt?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell az Engystolt tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

### 1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER AZ ENGYSTOL ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

Az Engystol homeopátiás gyógyszer.

A homeopátiás hagyománynak megfelelően alkalmazható:

- influenza,
- lázzal járó vírusfertőzések esetén a tünetek csökkentésére.

### 2. TUDNIVALÓK AZ ENGYSTOL SZEDÉSE ELŐTT

#### Ne szedje az Engystolt

- ha allergiás a hatóanyagokra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére.

#### Figyelmeztetések és óvintézkedések

A homeopátiás gyógyszerkészítmények alkalmazásának kezdetén a fennálló tünetek átmenetileg erősödhetnek. Ilyen esetben az Engystol szedését időlegesen fel kell függeszteni és orvoshoz kell fordulni.

A homeopátiás gyógyszert nem szabad az indokoltnál hosszabb ideig vagy a tünetek megszűnését követően alkalmazni, mert ilyen esetben nem kívánatos hatások (ún. gyógyszervizsgálati tünetek) léphetnek fel.

A homeopátiás gyógyszer alkalmazásának időtartama alatt nem szabad illóolajat is tartalmazó (mentolos, eukaliptuszos) termékeket (cukorka stb.) fogyasztani és intenzív illatú fogkrémet használni.

A kezelés ideje alatt aromás anyagokat tartalmazó kenőcsöt (pl. kámforos) sem szabad alkalmazni, mivel ezek jelentős mértékben képesek befolyásolni a homeopátiás gyógyszer hatását.

### **Gyermekek**

Az Engystol nem javasolt 3 éves kor alatti gyermekeknek a biztonságosságra és a hatékonyságra vonatkozó adatok hiánya miatt.

### **Egyéb gyógyszerek és az Engystol**

Nem ismert, hogy az Engystol befolyásolja más gyógyszerkészítmények hatását, vagy más gyógyszerkészítmények befolyásolják az Engystol hatását.

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett, valamint szedni tervezett egyéb gyógyszereiről.

### **Terhesség, szoptatás és termékenység**

Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer szedése előtt beszéljen kezelőorvosával.

A készítmény hatóanyagainak a termékenységet befolyásoló hatására vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

### **A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre**

Az Engystolnak a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket befolyásoló hatásait nem vizsgálták.

### **Az Engystol tejcukrot (laktózt) tartalmaz**

Amennyiben kezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny, keresse fel orvosát vagy gyógyszerészét mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert.

## **3. HOGYAN KELL SZEDNI AZ ENGYSTOLT?**

Az Engystolt mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

### **A készítmény ajánlott adagja:**

Felnőtteknek és 12 év feletti serdülőknek: naponta 3-szor 1 tablettát.

Gyermekeknek:

6-11 év közötti gyermekeknek naponta 2-szer 1 tablettát.

3-5 év közötti gyermekeknek naponta 1-szer 1 tablettát.

A panaszok enyhülésekor az adagolás gyakoriságát csökkenteni kell.

### **Az alkalmazás módja**

Étkezés előtt legalább 30 perccel vegye be a tablettát. Mielőtt lenyeli, tartsa a szájában amíg az szétesik.

### **Alkalmazása gyermekeknél**

Gyermekeknek a tablettát összetörve, kis mennyiségű vízhez keverve is be lehet adni.

### **Az alkalmazás időtartama**

Ha tünetei 3 napon túl változatlanul fennállnak vagy súlyosbodnak, vagy új tünetek jelennek meg keresse fel orvosát, aki az Ön további kezelését meghatározza.

### **Ha az előírtnál több Engystolt vett be**

Keresse fel orvosát, aki az esetleges szükséges intézkedésekről dönteni tud.

### **Ha elfelejtette bevenni az Engystolt**

Ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott tablettá pótlására. A következő tablettát vegye be a szokásos időben.

Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

## **4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK**

Mint minden gyógyszer, így az Engystol is okozhat mellékhatásokat, melyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

**Nagyon ritkán**, (10 000-ból kevesebb, mint 1 gyógyszereszedőt esetében) bőrkiütés és gyomor-bélrendszeri panaszok előfordulhatnak.

Ilyen esetben a gyógyszer alkalmazását abba kell hagyni és orvoshoz kell fordulni.

### **Mellékhatások bejelentése**

Ha Önél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát, vagy gyógyszerészét. Ez a beteg tájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti postai úton az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Magyarország, Postafiók 450, H-1372 Budapest címre, vagy elektronikusan a [www.ogyei.gov.hu](http://www.ogyei.gov.hu) weboldalon keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

## **5. HOGYAN KELL AZ ENGYSTOLT TÁROLNI?**

- A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
- Legfeljebb 25°C-on, a nedvességtől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó.
- A címkén és a dobozon feltüntetett lejárati idő („Felhasználható:”) után ne szedje az Engystolt. A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.
- Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

## **6. A CSOMAGOLÁS TARTALMA ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK**

### **Mit tartalmaz az Engystol?**

1 tablettá hatóanyag-tartalma:

Vincetoxicum hirundinaria	D6	75,0 mg
Vincetoxicum hirundinaria	D10	75,0 mg
Vincetoxicum hirundinaria	D30	75,0 mg
Sulfur	D4	37,5 mg
Sulfur	D10	37,5 mg

Egyéb összetevők: laktóz-monohidrát (kb. 300 mg), magnézium-sztearát.

### **Milyen az Engystol külleme és mit tartalmaz a csomagolás**

Az Engystol sárgásfehér színű, kerek, lapos felületű, metszett élű, szagtalan tablettá. Törési felülete fehér színű.

A tabletták műanyag kupakkal lezárt műanyag tartályban és dobozban kerülnek forgalomba. A csomagolás 50 db vagy 250 db tablettát tartalmaz.

Nem feltétlenül mindegyik kiszereles kerül kereskedelmi forgalomba.

**A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó**

Biologische Heilmittel Heel GmbH,

Dr. -Reckeweg-Str. 2-4,

76532 Baden-Baden, Németország

Telefon: 00 49 (0) 7221 501 00

Fax: 00 49 (0) 7221 501 210

Email: [info@heel.de](mailto:info@heel.de)

**Helyi képviselő:**

Dr. Peithner Budapest Kft.,

Tel.: +36 (1) 431 8954,

Fax: +36 (1) 431 8953

e-mail: [info@schwabe.hu](mailto:info@schwabe.hu)

OGYI-HG-101/01 (50 db)

OGYI-HG-101/02 (250 db)

**A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2017. június**